

Šumavské slatě



Pro vznik slatí na Šumavě existovaly takřka ideální podmínky, tedy mělké pánve, sedla, mírné svahy, náhorní roviny, pláně. Dále také široká, mělká údolí potoků a jejich některých přítoků. Podnebí je zde velmi chladné a vlhké, pramenišť je dostatek a horninový podklad pod zvětralinovým pláštěm není pro vodu příliš propustný.

Rašeliniště vznikla na přelomu poslední doby ledové a meziledové (zhruba před 9000 až 10 000 lety). Tehdy skončilo velmi chladné a přitom suché podnebí, vystřídalo jej teplejší a vlhčí. Rašelinišť vznikly dva druhy; náhorní vrchoviště na pláních a při Vltavě a jejich větších přítocích pak rašeliniště údolní.

Seznam slatí

- Chalupská slat' je rašeliniště přechodného typu mezi údolním a horským vrchovištěm. Nachází se v katastrálním území Svinná Lada, zhruba 1 km severně od Borových Lad, v nadmořské výšce 900–950 m. Rozloha slatí je 137 ha. Náleží do I. zóny Národního parku Šumava. Slat' je zpřístupněna naučnou stezkou, která vede po 260 metrů dlouhé poválkové cestě. Na okraji se v minulosti těžila rašelina. Území je chráněno coby přírodní památka Borová Lada (44 km)
- Tříjezerní slat' o rozloze 19 ha se nachází asi 2,5 km severozápadně od obce Modrava, na pomezí katastrálních území Javoří Pila a Vchynice-Tetov I. Jde o ukázkou typického šumavského vrchovištního rašeliniště, na kterém se vyskytuje mnoho vzácných rostlin. 250 m dlouhá okružní naučná stezka vede kolem tří rašelinných jezírek, podle kterých dostala slat' jméno. Tříjezerní slat' je nejmenší z celkem tří zpřístupněných rašelinišť na české straně Šumavy, Jezerní slat' i Chalupská slat' mají rozlohu přes 100 ha.(47 km)
- Jezerní slat' je rašeliniště a přírodní památka v okrese Prachatice. Nachází se na Šumavě (Šumavské pláně), necelé 2 km jihovýchodně od Horské Kvildy a 3 km od Kvildy, na území obce Kvilda. Je součástí NP Šumava, jehož je I. Zónou (42km)
- Modravské slatě – pro veřejnost nepřístupné
- Cikánská slat' Cikánská slat' je vrchovištní rašeliniště v Národním parku Šumava asi 2 km jihozápadně od obce

Modrava, na jižním svahu Modravské hory v nadmořské výšce 1103 m. Je protáhlého tvaru a rozprostírá se ve směru východ - západ, uprostřed je zúžené. Je porostlé většinou smrky, zčásti klečí a jen místy je špatný luční porost. Uprostřed rašeliniště je několik malých jezírek, výměra slati je 102,01 ha, hloubka až 620 cm, odhadovaná zásoba rašeliny 1 341 000 m³.

Pramení zde Cikánský potůček, levostranný přítok Modravského potoka. Porost tvoří smrky, kleč (*Pinus mugo* x *pseudopumilio*), rašeliníky, suchopýr pochvatý, vřes obecný, vlohyně bahenní, klikva, kyhanka sivolistá, ostřice, rosnatka okrouhlostá.

Cikánská slať je turisticky dostupná po zelené stezce spojující Modravu a Březník. (47 km)

Podrobnosti na stránkách:

- <http://www.sumavanet.cz/vopin/slate/slate.htm>
- <http://www.sumavanet.cz/susice/fr.asp?tab=snet&id=1364>
- http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umavsk%C3%A9_slat%C4%9B